

Monitoraggio 2022 *Ostreopsis cf. ovata*

| Provincia | Comune | Località di campionamento | Coordinate Geografiche | | Giugno | | | Luglio | | | | Agosto | | | Settembre | | |
|----------------|---------------------|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|-------|--------|--------|--------|---------|-------|-----------|---------|-------|
| | | | Latitudine N | Longitudine E | 16/06 | 20/06 | 27/06 | 04/07 | 06/07 | 18/07 | 20/07 | 01/08 | 02/08 | 16/08 | 17/08 | 12/09 | 19/09 |
| | | | Concentrazioni di <i>Ostreopsis cf. ovata</i> (cell/L) | | | | | | | | | | | | | | |
| Palermo | Trappeto | Porticciolo – punto di campionamento presso la spiaggia alle spalle del molo | 38,0698° | 13,0367° | 3.920 | | | 4.160 | | | 1.360 | | 240 | | 160 | 800 | |
| | Terrasini | Cala Rossa - punto di campionamento presso la spiaggia adiacente "Sea Club" | 38,1421° | 13,0724° | 3.200 | | | 9.920 | | | 14.080 | | Assente | | Assente | Assente | |
| | Capaci | Capaci | 38,1840° | 13,2343° | 55.868 | 18.480 | | 1.680 | | | 7.440 | | 80 | | 7.600 | 1.680 | |
| | Isola delle Femmine | Costa Corsara | 38,1972° | 13,2432° | 34.160 | 79.120 | 40.920 | 7.600 | | | 10.720 | | 560 | | 960 | 1.040 | |
| | Palermo | Sferracavallo | 38,1991° | 13,2716° | 2.240 | | | | 8.240 | 3.120 | | 4.240 | | 1.600 | | | 400 |
| | Palermo | Barcarello | 38,2091° | 13,2822° | 22.000 | | | | 4.880 | 10.800 | | 80 | | 320 | | | 2640 |
| | Palermo | Punto di campionamento presso la spiaggia antistante la "tonnara Bordonaro"- Vergine Maria | 38,1661° | 13,3693° | 3.600 | | | | 8.480 | 6.640 | | 560 | | 1.760 | | | 1520 |
| | Bagheria | Aspra - Punto di campionamento presso la spiaggia con accesso da Via Fiume D'Italia | 38,1069° | 13,5000° | 280 | | | | 4.760 | 17.120 | | 1.640 | | 160 | | | 720 |

Limite indicato dal D.M. 30/03/2010 per la densità di *Ostreopsis ovata*: 30.000 cell/L

Matrice: **acqua**

Laboratorio competente per il monitoraggio: **UOC AREA Mare**

In rosso i valori di concentrazione superiori al limite di 30.000 cell/l

Tutte le stazioni vengono campionate con frequenza mensile nei mesi di Giugno e Settembre e quindicinale nei mesi di Luglio ed Agosto per un monitoraggio di sorveglianza