

Monitoraggio <i>Ostreopsis cf. ovata</i> - anno 2019										
Provincia	Comune	Località di campionamento	Coordinate Geografiche		Giugno	1-15 Luglio	16-31 Luglio	1-15 Agosto	16-31 Agosto	Settembre
			Latitudine	Longitudine						
Concentrazioni di <i>Ostreopsis cf. ovata</i> (cell/L)										
Palermo	Trappeto	Porticciolo – punto di campionamento presso la spiaggia posta alle spalle del molo	38,0705	13,0353	<60	560	3.080	1.960	1.160	560
	Terrasini	Cala Rossa - punto di campionamento presso la spiaggia adiacente "Sea Club"	38,1421	13,0724	<60	2.960	81.567	47.255 14.480	480	Assente
	Isola delle Femmine	Costa Corsara	38,1973	13,2435	120	28.280	5.960	36.600 22.480	120	320
	Palermo	Sferracavallo	38,2017	13,2767	400	25.760	5.800	96.264 66.731	19.360 10.080	6.160
	Palermo	Punto di campionamento con accesso dal rimessaggio "Nautica Barcarello"	38,2111	13,2877	80	7.480	24.274	60.140 7.920	1.200	80
	Palermo	Punto di campionamento presso la spiaggia antistante la "tonnara Bordonaro"- Vergine Maria	38,1661	13,3693	<60	10.560	57.823	9.600	1.160	800
	Bagheria	Aspra - Punto di capionamento presso la spiaggia con accesso da Via Fiume D'Italia	38,1067	13,4996	280	8.120	8.200	1.760	7.120	2.160
	Santa Flavia	Sant'Elia - Punto di campionamento pressi spiaggia con accesso da scalinata su SS 113	38,0999	13,5360	<60	320	2.960	600	160	Assente
	Trabia	Punto di campionamento presso la spiaggia antistante la Tonnara	37,9980	13,6517	<60	< 60	320	200	Assente	Assente

Limite indicato dal D.M. 30/03/2010 per la densità di *Ostreopsis ovata*: 30.000 cell/L

Matrice: **acqua**

Laboratorio competente per il monitoraggio: **ST3 – AREA MARE**

In rosso i valori di concentrazione superiori al limite di 30.000 cell/l